




| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>疾病 (異常)</p> | <p>2 1 変 性 (肝臓の変性)</p> | | |
| <p>肉 眼 所 見</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・肝臓は軽度または著しく腫大し、多くは黄白色、黄色、黄土色、桃色など淡色となり、実質は軟弱かつ脆く、しばしば点状出血がみられる (脂肪肝)。 ・肝臓は広範囲あるいは部分的に薄緑色、緑色、暗緑色等に変色する (緑色肝)。 ・緑色肝では発育不良を伴うこともある。 ・肝臓の表面に凹凸が認められることもある。 <p>参考文献</p> <p>1 上田 豊, 他:プロイラー鶏における緑色肝と骨髄炎との関連性, 日獣会誌, 61, 395-399 (2008)</p> <p>2 Andreasen CB: Staphylococcosis, Diseases of poultry, 12th ed, Saif YM ed, 892-900, Blackwell Publishing, Ames (2008)</p> | | |
| <p>廃棄等の 措置の根拠</p> | <p>別表第 1 1 (部分廃棄)</p> | | |
|  <p>1</p> |  <p>2</p> |  <p>3</p> | |
| <p>著しく腫大し、全域が黄白色に退色している。</p> | <p>著しく腫大し、全域が退色し、境界明瞭な赤色斑も認められる。</p> | <p>軽度に腫大し、全域が暗緑色を呈している。</p> | |
|  <p>4</p> |  <p>5</p> |  <p>6</p> | |
| <p>部分的に緑色を呈している。</p> | <p>軽度に腫大し、広範に退色、凹凸が認められる。</p> | <p>脂肪肝: 腫大した肝細胞の細胞質に種々の大きさの脂肪滴が存在する。</p> | |