





疾病 (異常)	<h2 style="text-align: center;">24 腹水症</h2>		
肉眼所見	<ul style="list-style-type: none"> <li>・腹部は著しく膨満して波動感がみられ、腹部の皮膚は透明感のある色調となっている。</li> <li>・黄色透明あるいは血様色の腹水は肝腹膜嚢に貯留し、ときにゼラチン様物を混じている。</li> <li>・肝被膜が混濁、肥厚し、しばしば被膜面が凹凸する。ときに肝臓のうっ血、萎縮、硬化を伴っている。</li> <li>・内臓と同時に気管や食道が摘出されるとたいでは、胸部前方の皮下組織に肝腹膜嚢に貯留した腹水が漏出している。</li> <li>・大腸菌症を伴う腹水症も多く認められる。</li> </ul> <p style="text-align: center;">参考文献</p> <p>1 Crespo R, et al: Pulmonary hypertension syndrome in broiler chickens, Diseases of poultry, 13th ed, Swayne DE, et al eds, 1246-1249, Wiley-Blackwell, Ames (2013)</p> <p>2 中村菊保：ブロイラーの腹水症の病態と予防, 鶏病研報, 49(増刊号), 25-32 (2013)</p>		
廃棄等の措置の根拠	<h3 style="text-align: center;">別表第10 (全部廃棄)</h3>		
 <p style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold;">1</p>	 <p style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold;">2</p>	 <p style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold;">3</p>	
腹部は著しく膨満しており、波動感がみられる。	胸部前方の皮下組織 (矢印) に肝腹膜嚢の腹水が漏出している。	肝被膜は肥厚し、被膜面が凹凸している。腹水は黄色化し増量している。	
 <p style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold;">4</p>	 <p style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold;">5</p>	 <p style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold;">6</p>	
肝被膜の肥厚、被膜面の凹凸、肝腹膜嚢の一部 (矢頭) に褐色液が貯留、右心室は高度に拡張している。	肝臓のうっ血、腫大、被膜の肥厚、被膜面の凹凸及び右心室の拡張が観察される。	肝被膜の漿膜下組織は肥厚し、漿液線維素性滲出物を伴い線維芽細胞及び膠原線維が増生している。	